

# Información de Droga: Xilacina



## ¿Qué es la xilacina?

La xilacina es un sedante no opioide que es aprobada para el uso con medicina veterinaria. No es segura para el uso humano. A pesar de eso, se encuentra en suministros de drogas ilícitas y es conectada con una gran cantidad de sobredosis en los Estado Unidos.

Se refiere a la xilacina como “Tranq” y “Tranq Dope”. El modo más común de usar es inyectarla directamente en el flujo sanguíneo, pero también se puede inhalar o beber en forma de píldora.

Es especialmente peligrosa cuando es adulterada (mezclada) con el fentanilo (un opioide). Como resultado, en 2023 la Oficina Nacional de la Política de Control de Drogas de la Casa Blanca catalogó esta combinación de drogas como Amenaza Emergente.

## ¿Por qué personas toman la xilacina?

Algunas personas consuman drogas (como el fentanilo) mezcladas con la xilacina para extender los efectos sedantes o eufóricos. Otras la toman sin saber. A menudo los individuos quienes fabrican y venden drogas ilícitas la añaden a la cocaína, la heroína y el fentanilo. Frecuentemente, cuando los consumidores de drogas ilícitas las compran en línea o en su comunidad no saben que están mezcladas con la xilacina.

## ¿Cómo afecta la xilacina a la mente y al cuerpo?

La xilacina tiene efectos peligrosos contra el cuerpo humano. Puede disminuir el ritmo cardiaco y ralentiza la actividad cerebral. Puede dificultar la respiración y resultar con la presión peligrosamente baja. También puede causar que el consumidor pierda la consciencia temporalmente.

El uso repetido puede resultar con abscesos, llagas y otras heridas peligrosas. Los síntomas de abstinencia son severos, y cuando está combinada con opioides, tales como la heroína o el fentanilo, hay riesgo aumentado de sobredosis mortal.



- La xilacina es especialmente peligrosa cuando es combinada con otros opioides, y puede resultar con una sobredosis.
- Puede causar heridas graves en la piel que pueden resultar con la amputación de extremidades y puede poner la vida en peligro.
- Cualquier persona padeciendo de una posible sobredosis debe recibir tratamiento de naloxona inmediatamente y deben de llamar al 9-1-1.

## ¿Cuáles son las heridas que causa la xilacina?

El uso de la xilacina puede causar heridas graves que resultan con infección, y sin tratamiento, puede resultar con amputación de la parte del cuerpo afectada. Pueden aparecer cuando se le inyecta la droga o que se la ingiere de otra manera. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, no solamente en el lugar de la inyección.

Las heridas pueden verse como: ampollas, hoyos de cabeza de alfiler en la piel, llagas grandes y abiertas, moretones pequeños de color morado, y costras, o pedazos oscuros o negros de piel muerta.

Hay tres etapas del desarrollo de la herida. Es vital buscar atención medica la primera vez que ve la herida.



**CONNECTICUT  
Clearinghouse**  
a program of the Connecticut Center  
for Prevention, Wellness and Recovery

**800.232.4424 (phone)**  
**[www.ctclearinghouse.org](http://www.ctclearinghouse.org)**

**A Library and Resource Center on Alcohol, Tobacco, Other Drugs, Mental Health and Wellness**

## Busque atención médica lo antes posible si tiene una herida y:

- La piel roja, dura y caliente al tocar
- Fiebre y escalofríos
- Descarga viscosa, maloliente, color verde o amarillo escurriendo de la herida
- La piel entumecida (no puede sentir) o una sensación de hormigueo
- Dolor severo en el lugar de la herida
- Incapacidad de mover la parte del cuerpo donde está la herida
- Se le cae pedazos de piel
- Se puede ver hueso

## Cómo ayudar a alguien que padezca de una sobredosis

**La Naloxona:** es una medicina que se usa para revertir una sobredosis de opioides de manera rápida. Salva vidas. Se le debe de administrar para **cualquier sobredosis posible**. No causa ningún daño, no importa si haya opioides presentes o no.

Aunque no revertirá los efectos de la xilacina, de todos modos, se debe de usar para revertir los efectos del fentanilo u otro opioide que pueda estar mezclado con la xilacina.

**Contacte a servicios de urgencia:** Llamar al 9-1-1 es necesario porque se considera la sobredosis como urgencia médica. Asegúrese de quedar con la persona padeciendo de la sobredosis hasta que llegue el personal de urgencias. En Connecticut, y otros estados, tanto la persona quien padeció de la sobredosis como la persona que le proveyó ayuda en la situación emergente tienen protección contra el arresto y los cargos de lo penal bajo la ley del Buen Samaritano.

**Administre respiraciones de rescate:** las respiraciones de rescate son extremadamente útiles para una persona padeciendo de una sobredosis cuya respiración ha disminuido debido a la xilacina.

Para administrar las respiraciones de rescate a adultos: asegure que no haya obstrucción a su vía respiratoria, coloque una mano en la mandíbula de la persona, incline la cabeza de la persona hacia atrás y pellízquele la nariz para cerrarla.

Coloque la boca de usted sobre a de la otra persona, haciendo un sello y dele dos soplos lentos. Verifique que mueva el pecho (asegúrese que es el pecho, no el estómago), y siga con un soplo cada cinco segundos.

## ¿Cómo es que una persona quien usa drogas ilícitas puede reducir los peligros de una sobredosis?

- **Nunca use a solas:** Es más seguro ingerir drogas mientras estar cerca de una persona de confianza quien puede administrar la naloxona y llamar 9-1-1 en caso de urgencia. Hay servicios para consumidores para cuando van a usar drogas y no tienen alguien de confianza a quien acudir. [Never Use Alone](#) (nunca use a solas) es un ejemplo de este servicio.
- **Obtenga la naloxona y aprenda cómo usarla:** La naloxona puede revertir los efectos de cualquier opioide que esté mezclado con la xilacina. Se puede obtener entrenamientos sobre cómo usar la naloxona e información sobre donde obtenerla en [drugfreeCT.org](http://drugfreeCT.org), y en Organizaciones Regionales de Acción en Salud Conductual (RBHAO por sus siglas en inglés). También está disponible como NARCAN, un spray nasal de venta libre en las farmacias.
- **Conozca los riesgos de usar drogas ilícitas con ingredientes desconocidos:** como no hay control sobre las drogas ilícitas, es difícil saber que contienen. Los fabricantes de drogas ilícitas las adulteran frecuentemente con otras drogas, tales como la xilacina.
- **Reduzca los riesgos relacionados con la inyección:** Utilice aguja esterilizada, utilice varios lugares de inyección, permita que la piel y las venas se curen antes de usar de nuevo o tome las drogas de una manera diferente.
- **Haga una prueba de la droga antes de usarla:** Hay tiras de prueba disponibles en la tienda para verificar si xilacina está presente dentro de la droga.

## Recursos de Connecticut

CT Department of Mental Health and  
Addiction Services  
[www.ct.gov/DMHAS](http://www.ct.gov/DMHAS)

CT Center for Harm Reduction  
[www.harmreduction-ct.org](http://www.harmreduction-ct.org)

CT Harm Reduction Alliance  
[www.ghhrc.org](http://www.ghhrc.org)

Drug Free CT  
[www.drugfreect.org](http://www.drugfreect.org)

## Recursos Nacionales

Substance Abuse and Mental Health  
Services Administration  
[www.samhsa.gov](http://www.samhsa.gov)

National Institute on Drug Abuse  
[www.nida.nih.gov](http://www.nida.nih.gov)

National Harm Reduction Coalition  
[harmreduction.org](http://harmreduction.org)



CONNECTICUT  
Mental Health & Addiction Services