

Medetomidina



Recursos de Connecticut

Departamento de Salud Mental y Servicios para la Adicción de CT
***.ct.gov/DMHAS

CT Center for Harm Reduction
***.harmreduction-ct.org

CT Harm Reduction Alliance
***.ghrc.org

Drug Free CT Libre de Drogas
***.drugfreect.org

Recursos Nacionales

Administración de Servicios para la Salud Mental y Adicción

***.samhsa.gov

¿Qué es Medetomidina?

Medetomidina, como xilazina, es un sedante no opioide y anestésico que se usa en medicina veterinaria. Sin embargo, es como 200 veces más poderosa que la xilazina.

Ninguna de las sustancias fue diseñada para uso con seres humanos. Están añadiendo la medetomidina al fentanilo, tanto como otras drogas de la calle y píldoras falsas. En algunas áreas ha remplazado la xilazina como el adulterante de droga más común, pero también se puede incluir con la xilazina. Adulterantes son las sustancias que se añaden para aumentar el tamaño, los efectos o para reducir los costos.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

Los efectos sedantes pueden durar de 2-3 horas, pero se puede prolongarlos cuando está combinada con opioides. Los efectos iniciales pueden incluir:

- Presión arterial muy baja
- Ritmo cardíaco lento
- Somnolencia extrema
- Dificultad para respirar
- Hipotermia
- Sobredosis
- Coma

La Naloxona no tendrá ningún efecto contra la medetomidina dentro del cuerpo debido a que no es un opioide. Sin embargo, **de todos modos, se debe de usar la naloxona** cuando hay sospecha de una sobredosis debido a la presencia probable de opioides.

¿Cuáles son los síntomas de abstinencia de la medetomidina?

Los síntomas de abstinencia de sustancias que contienen medetomidina ocurren dentro de horas y pueden poner en riesgo la vida. Los síntomas de abstinencia pueden incluir:

- Presión arterial muy alta
- Ritmo cardíaco acelerado
- Temblores
- Alucinaciones
- Vómito
- Estado de alerta disminuido
- Psicosis

Llame al 911 para ayuda médica en el caso de una sobredosis o síntomas de abstinencia.

¿Cómo es que las personas se pueden mantener seguras?

Nunca use a solas: que una persona de confianza esté presente que le puede administrar la Naloxona y llamar al 911 en caso de una urgencia. **Safe Spot (Lugar Seguro)** es un servicio para personas quienes usan drogas y no tienen ningún contacto de confianza a quien acudir para ayuda en caso de una sobredosis. Llame a Safe Spot al **800-972-0590**.

Tenga Naloxona encima: Naloxona puede revertir los efectos de cualquier opioide que esté mezclado con la medetomidina. Naloxona está disponible a través de **DrugFreeCT.org** tanto como los **RBHAOs** y de venta libre en farmacias.

Haga una prueba de la droga antes de usarla: Hay tiras de prueba disponibles para determinar si medetomidina está presente en la droga. Visite al **DrugFreeCT.org** para obtener más información.

Reducir los riesgos relacionados con inyección: Use agujas esterilizadas, cambie los lugares de inyección, permita que la piel y la venas se curen antes de usar otra vez o consuma la droga de otra manera.



CONNECTICUT Clearinghouse
a program of the Connecticut Center for Prevention, Wellness and Recovery

800.232.4424

www.ctclearinghouse.org



CONNECTICUT
Mental Health & Addiction Services